

IDADE	VACINAS
A PARTIR DO NASCIMENTO	BCG ¹
	HEPATITE B ²
2 MESES	VACINA VIP ³
	PENTAVALENTE ⁷
	ROTAVÍRUS ⁴
	PNEUMOCÓCICA 10 VALENTE ⁸
3 MESES	MENINGOCÓCICA C CONJUGADA ⁹
4 MESES	VACINA VIP ³
	PENTAVALENTE ⁷
	ROTAVÍRUS ⁵
	PNEUMOCÓCICA 10 VALENTE ⁸
5 MESES	MENINGOCÓCICA C CONJUGADA ⁹
6 MESES	VACINA VOP ⁶
	PENTAVALENTE ⁷
	PNEUMOCÓCICA 10 VALENTE ⁸
9 MESES	FEBRE AMARELA ¹⁰
12 MESES	TRIPLICE VIRAL ¹¹
	MENINGOCÓCICA C CONJUGADA ⁹
	HEPATITE A
15 MESES	DTP ¹³
	VACINA ORAL POLIOMIELITE (VOP) ⁶
	TETRAVIRAL ¹²
	PNEUMOCÓCICA 10 VALENTE ⁸
5 ANOS	DTP ¹³
	VACINA VOP ⁶
6 MESES a < 5 ANOS	INFLUENZA ¹⁴

1. Vacina BCG caso a vacina não tenha sido aplicada na maternidade, administrar na primeira visita ao serviço de saúde.
2. Vacina Hepatite B primeira dose deve ser administrada preferencialmente nas primeiras 12/24 hs de vida, ainda na maternidade. Caso não tenha sido aplicada na maternidade, administrar na primeira visita ao serviço de saúde.
3. Vacina Inativada Poliomielite (VIP), aplicada aos 2 e 4 meses.
4. A 1ª dose da vacina Rotavírus deve ser aplicada aos 2 meses de idade. Idade mínima para a administração dessa dose é de 1 mês e 15 dias e a idade máxima é de 3 meses e 15 dias.
5. A 2ª dose da vacina Rotavírus deve ser aplicada aos 4 meses de idade. A idade mínima para a administração dessa dose é de 3 meses e 15 dias e a idade máxima é de 7 meses e 29 dias.
6. Vacina Oral de Poliomielite (VOP), será aplicada aos 6 meses de idade, no primeiro reforço (15 meses) e segundo reforço (entre 4 e 6 anos de idade).
7. Vacina Pentavalente (Difteria +Tétano + Coqueluche + Haemophilus Influenza TIPO b + Hepatite B) é aplicada aos 2, 4 e 6 meses de idade, com intervalo de 2 meses (mínimo de 30 dias). Poderá ser aplicada para as crianças menores de 5 anos de idade. NÃO deve ser administrada antes dos 2 meses de vida, pois poderá induzir tolerância imunológica as doses adicionais dos componentes Hib e Pertussis. Para completar o esquema vacinal da DTP, o primeiro reforço é aplicado aos 15 meses e o segundo entre 4 e 6 anos de idade.
8. Vacina Pneumocócica 10 Valente é aplicada aos 2, 4, 6 e 15 meses.
9. Vacina Meningocócica C Conjugada é aplicada aos 3, 5 e 12 meses.
10. Vacina Febre Amarela para as pessoas que residem ou viajam para regiões onde houver indicação, de acordo com a situação epidemiológica. Reforço a cada 10 anos.
11. Vacina Tríplice Viral (SARAMPO, CAXUMBA E RUBÉOLA), é aplicada aos 12 meses.
12. Vacina Tetraviral (Sarampo, caxumba, rubéola e varicela) – introduzida no calendário de vacinação a partir de 01/10/2013 para as crianças nascidas a partir de 01/06/2012. Deve ser aplicada aos 15 meses desde que a criança tenha recebido uma dose de SCR com intervalo mínimo de 30 dias.
13. Vacina DTP (Difteria +Tétano + Coqueluche) só pode ser administrada em crianças até 6 anos, 11 meses e 29 dias. A partir dos 7 anos de idade utilizar a vacina dT (Difteria +Tétano).
14. Vacina Influenza aplicada anualmente para todas as crianças entre 6 meses e < 5 anos de idade, preferencialmente, nos meses que antecedem o inverno, durante a Campanha Nacional de Vacinação Contra Influenza.