

INTERVALO ENTRE AS DOSES	VACINAS	ESQUEMA
<b>PRIMEIRA VISITA</b>	BCG <sup>2</sup>	DOSE ÚNICA
	HEPATITE B	PRIMEIRA DOSE
	DT <sup>3</sup>	PRIMEIRA DOSE
	POLIOMIELITE <sup>2</sup>	PRIMEIRA DOSE
	TRÍPLICE VIRAL <sup>4</sup>	PRIMEIRA DOSE
<b>2 MESES APÓS A PRIMEIRA VISITA</b>	HEPATITE B	SEGUNDA DOSE
	dT <sup>3</sup>	SEGUNDA DOSE
	POLIOMIELITE <sup>2</sup>	SEGUNDA DOSE
	TRÍPLICE VIRAL <sup>4</sup>	SEGUNDA DOSE
	FEBRE AMARELA <sup>5</sup>	DOSE INICIAL
<b>4 MESES APÓS PRIMEIRA VISITA</b>	HEPATITE B <sup>6</sup>	TERCEIRA DOSE
	dT <sup>3</sup>	TERCEIRA DOSE
	POLIOMIELITE <sup>2</sup>	TERCEIRA DOSE
	TRÍPLICE VIRAL <sup>4</sup>	TERCEIRA DOSE
<b>2014</b>	VACINA HPV <sup>7</sup>	*Adolescentes do sexo feminino, de 11 a 13 anos. *Indígenas do sexo feminino, de 9 a 13 anos.
<b>2015</b>	VACINA HPV	*Adolescentes do sexo feminino, de 9 a 11 anos. *Indígenas do sexo feminino, de 9 anos * ampliação da vacinação para mulheres de 14 a 26 anos vivendo com HIV.
<b>2016</b>	VACINA HPV	*Adolescentes do sexo feminino de 9 anos de idade, nascidas entre 01/01 e 31/12 do ano em que completam 9 anos. *Indígenas do sexo feminino de 9 anos de idade, nascidas entre 01/01 e 31/12 do ano em que completam 9 anos
<b>A CADA 10 ANOS</b>	dT <sup>3</sup>	REFORÇO
	FEBRE AMARELA <sup>5</sup>	REFORÇO

1. Adolescência – período entre 10 e 19 anos de idade (OMS, SBP). Caso a pessoa apresente documentação com esquema de vacinação incompleto, é suficiente completar o esquema já iniciado. Ressalte-se que a adolescência é o período apropriado para a verificação e complementação de esquemas vacinais iniciados na infância.
2. As vacinas BCG e poliomielite oral são indicadas, prioritariamente, para pessoas com até 15 anos de idade. Havendo disponibilidade utilizar a vacina poliomielite inativada.
3. Vacina Difteria e Tétano.
4. Vacina Tríplice Viral (SARAMPO, CAXUMBA E RUBÉOLA)
5. Vacina Febre Amarela. Para pessoas que residem ou viajam para regiões onde houver indicação, de acordo com a situação epidemiológica.
6. Vacina Hepatite B. O intervalo mínimo entre a segunda e a terceira dose é de dois meses desde que o intervalo de tempo decorrido entre a primeira e terceira dose seja, no mínimo, de quatro meses.
7. Vacina Papiloma Vírus Humano. O esquema vacinal a ser utilizado no Brasil será de 3 doses (0, 6 e 60 meses), ou seja, o intervalo entre a primeira e segunda dose é de 6 meses e entre a primeira e terceira dose é de 60 meses. Nas situações de atraso não haverá necessidade de recomeçar o esquema vacinal.

**Nota:** Vacina HPV - ampliação da vacinação para mulheres de 14 a 26 anos vivendo com HIV, a partir de 2015.