

CALENDÁRIO DE VACINAÇÃO PARA CRIANÇAS MENORES DE 6 ANOS DE IDADE

A vacinação infantil é essencial para proteger as crianças contra doenças infecciosas graves e fortalecer seu sistema imunológico desde cedo. Seguir o calendário vacinal é um ato de responsabilidade e amor, assegurando um futuro saudável e protegido para nossas crianças.



IDADE	VACINA	DOSE	DOENÇAS EVITADAS
Ao nascer	BCG	Única	Formas graves da tuberculose (miliar e meníngea)
	Hepatite B	Única	Hepatite B
2 meses	Pentavalente (DTP/Hib/HepB)	1ª dose	Difteria, Tétano, Coqueluche, Hepatite B e infecções causadas pelo <i>Haemophilus influenzae B</i>
	VIP (Vacina Inativada Poliomielite 1,2 e 3)	1ª dose	Poliomielite
	Pneumocócica 10V	1ª dose	Infecções invasivas (como meningite e pneumonia) e otite média média aguda, causadas pelos 10 sorotipos de <i>Streptococcus pneumoniae</i>
	VORH (Vacinal Oral Rotavírus Humano)	1ª dose	Diarreia por rotavírus
3 meses	Meningocócica C	1ª dose	Doença invasiva causada pela <i>Neisseria meningitidis</i> sorogrupo C
4 meses	Pentavalente (DTP/Hib/HepB)	2ª dose	Difteria, Tétano, Coqueluche, Hepatite B e infecções causadas pelo <i>Haemophilus influenzae B</i>
	VIP (Vacina Inativada Poliomielite 1,2 e 3)	2ª dose	Poliomielite
	Pneumocócica 10V	2ª dose	Infecções invasivas (como meningite e pneumonia) e otite média média aguda, causadas pelos 10 sorotipos de <i>Streptococcus pneumoniae</i>
	VORH (Vacinal Oral Rotavírus Humano)	2ª dose	Diarreia por rotavírus
5 meses	Meningocócica C	2ª dose	Doença invasiva causada pela <i>Neisseria meningitidis</i> sorogrupo C
6 meses	Pentavalente (DTP/Hib/HepB)	3ª dose	Difteria, Tétano, Coqueluche, Hepatite B e infecções causadas pelo <i>Haemophilus influenzae B</i>
	VIP (Vacina Inativada Poliomielite 1,2 e 3)	3ª dose	Poliomielite
	Covid-19*	1ª dose	Infecções pelo vírus Sars-Cov 2
7 meses	Covid-19*	2ª dose	Infecções pelo vírus Sars-Cov 2
9 meses	Covid-19*	3ª dose**	Infecções pelo vírus Sars-Cov 2
	Febre amarela	1ª dose	Febre amarela
12 meses	Pneumocócica 10V	Reforço	Infecções invasivas (como meningite e pneumonia) e otite média média aguda, causadas pelos 10 sorotipos de <i>Streptococcus pneumoniae</i>
	Meningocócica ACWY	Reforço	Doença invasiva causada pela <i>Neisseria meningitidis</i> sorogrupo C
	SCR (Sarampo/Caxumba/Rubéola)	1ª dose	Sarampo, caxumba e rubéola
15 meses	VIP (Vacina Inativada Poliomielite 1,2 e 3)	Reforço	Poliomielite
	DTP (Difteria/Tétano/pertussis)	1º reforço	Difteria, tétano e coqueluche
	Hepatite A	Dose única	Hepatite A
	SCR e Varicela	2ª dose de SCR e 1ª dose de Varicela	Sarampo, caxumba, rubéola e varicela
4 anos	DTP (Difteria/Tétano/pertussis)	2º reforço	Difteria, tétano e coqueluche
	Varicela***	2ª dose	Varicela
	Febre Amarela ****	Reforço	Febre Amarela
Anualmente	Influenza*****	Dose única	Infecções pelo vírus influenza

*Crianças vacinadas com vacinas covid-19 com cepas originais (Coronavac ou Pfizer baby) deverão completar o esquema vacinal com a vacina covid-19 disponível e recomendada no momento. Crianças com comorbidade/imunocomprometidas realizar esquema diferenciado conforme recomendações especiais.

**Terceira dose da vacina covid-19 a depender do fabricante.

***Indígenas, a partir de 4 anos, sem história pregressa da doença e sem histórico vacinal.

****Caso a pessoa tenha recebido apenas uma dose da vacina antes de completar 5 anos de idade, deverá receber uma dose adicional, independentemente da idade em que o indivíduo procure o serviço de vacinação, respeitando o intervalo mínimo de 4 semanas entre as doses.

*****Crianças indígenas está indicada a partir de 6 meses a 8 anos, 11 meses e 29 dias. Crianças não indígenas, de 6 meses até 5 anos, 11 meses e 29 dias de idade. Na primovacinação administrar duas doses com intervalo de 4 semanas.

Nota 1: Vacina pneumocócica 23 valente indicada para crianças indígenas a partir de 5 anos, sem comprovação vacinal de vacinas pneumocócicas conjugadas.