

# CALENDÁRIO DE VACINAÇÃO PARA CRIANÇAS MENORES DE 6 ANOS DE IDADE

A vacinação infantil é essencial para proteger as crianças contra doenças infecciosas graves e fortalecer seu sistema imunológico desde cedo. Seguir o calendário vacinal é um ato de responsabilidade e amor, assegurando um futuro saudável e protegido para nossas crianças.



IDADE	VACINA	DOSE	DOENÇAS EVITADAS
Ao nascer	<a href="#">BCG</a>	Única	Formas graves da tuberculose (miliar e meníngea)
	<a href="#">Hepatite B</a>	Única	Hepatite B
2 meses	<a href="#">Pentavalente (DTP/Hib/HepB)</a>	1ª dose	Difteria, Tétano, Coqueluche, Hepatite B e infecções causadas pelo <i>Haemophilus influenzae B</i>
	<a href="#">VIP (Vacina Inativada Poliomielite 1,2 e 3)</a>	1ª dose	Poliomielite
	<a href="#">Pneumocócica 10V</a>	1ª dose	Infecções invasivas (como meningite e pneumonia) e otite média média aguda, causadas pelos 10 sorotipos de <i>Streptococcus pneumoniae</i>
	<a href="#">VORH (Vacinal Oral Rotavírus Humano)</a>	1ª dose	Diarreia por rotavírus
3 meses	<a href="#">Meningocócica C</a>	1ª dose	Doença invasiva causada pela <i>Neisseria meningitidis</i> sorogrupo C
4 meses	<a href="#">Pentavalente (DTP/Hib/HepB)</a>	2ª dose	Difteria, Tétano, Coqueluche, Hepatite B e infecções causadas pelo <i>Haemophilus influenzae B</i>
	<a href="#">VIP (Vacina Inativada Poliomielite 1,2 e 3)</a>	2ª dose	Poliomielite
	<a href="#">Pneumocócica 10V</a>	2ª dose	Infecções invasivas (como meningite e pneumonia) e otite média média aguda, causadas pelos 10 sorotipos de <i>Streptococcus pneumoniae</i>
	<a href="#">VORH (Vacinal Oral Rotavírus Humano)</a>	2ª dose	Diarreia por rotavírus
5 meses	<a href="#">Meningocócica C</a>	2ª dose	Doença invasiva causada pela <i>Neisseria meningitidis</i> sorogrupo C
6 meses	<a href="#">Pentavalente (DTP/Hib/HepB)</a>	3ª dose	Difteria, Tétano, Coqueluche, Hepatite B e infecções causadas pelo <i>Haemophilus influenzae B</i>
	<a href="#">VIP (Vacina Inativada Poliomielite 1,2 e 3)</a>	3ª dose	Poliomielite
	Covid-19*	1ª dose	Infecções pelo vírus Sars-Cov 2
7 meses	Covid-19*	2ª dose	Infecções pelo vírus Sars-Cov 2
9 meses	Covid-19*	3ª dose**	Infecções pelo vírus Sars-Cov 2
	<a href="#">Febre amarela</a>	1ª dose	Febre amarela
12 meses	<a href="#">Pneumocócica 10V</a>	Reforço	Infecções invasivas (como meningite e pneumonia) e otite média média aguda, causadas pelos 10 sorotipos de <i>Streptococcus pneumoniae</i>
	<a href="#">Meningocócica C</a>	Reforço	Doença invasiva causada pela <i>Neisseria meningitidis</i> sorogrupo C
	<a href="#">SCR (Sarampo/Caxumba/Rubéola)</a>	1ª dose	Sarampo, caxumba e rubéola
15 meses	<a href="#">VIP (Vacina Inativada Poliomielite 1,2 e 3)</a>	Reforço	Poliomielite
	<a href="#">DTP (Difteria/Tétano/pertussis)</a>	1º reforço	Difteria, tétano e coqueluche
	<a href="#">Hepatite A</a>	Dose única	Hepatite A
	<a href="#">SCR e Varicela</a>	2ª dose de SCR e 1ª dose de Varicela	Sarampo, caxumba, rubéola e varicela
4 anos	<a href="#">DTP (Difteria/Tétano/pertussis)</a>	2º reforço	Difteria, tétano e coqueluche
	<a href="#">Varicela</a>	2ª dose	Varicela
	<a href="#">Febre Amarela ***</a>	Reforço	Febre Amarela
Anualmente	<a href="#">Influenza****</a>	Dose única	Infecções pelo vírus influenza

\*Crianças vacinadas com vacinas covid-19 com cepas originais (Coronavac ou Pfizer baby) deverão completar o esquema vacinal com a vacina covid-19 disponível e recomendada no momento. Crianças com comorbidade/imunocomprometidas realizar esquema diferenciado conforme recomendações especiais.

\*\*Terceira dose da vacina covid-19 a depender do fabricante.

\*\*\*Caso a pessoa tenha recebido apenas uma dose da vacina antes de completar 5 anos de idade, deverá receber uma dose adicional, independentemente da idade em que o indivíduo procure o serviço de vacinação, respeitando o intervalo mínimo de 4 semanas entre as doses.

\*\*\*\*Crianças de 6 meses até 2 anos, 11 meses e 29 dias de idade – Na primovacinação administrar duas doses com intervalo de 4 semanas.\*