

SARAMPO

ADMINISTRAÇÃO DO RETINOL (VITAMINA A) - SOLUÇÃO ORAL


Orientação para administração • USO ORAL (POR BOCA)

50.000 UI/mL

Solução Oral FRASCO de 5mL

INDICAÇÃO: Crianças menores de 6 meses**POSOLOGIA:** 50.000UI (1mL) por boca 1 vez ao dia por 2 dias.**PASSO A PASSO****1. HIGIENIZAR**


Lave as mãos com água e sabonete e seque-as bem.

**2. CONFERIR – 1ª DOSE**

Antes de administrar, confira se a prescrição e o rótulo da embalagem têm as informações: nome do medicamento, dosagem e prazo de validade.

1ª dose

Realizada em: __/__/__

**3. MEDIR**

Com auxílio de uma seringa graduada, puxe 1mL (equivalente a 50.000 UI) do conteúdo do frasco.

**4. ADMINISTRAR**

Com o bebê no colo, coloque a seringa na lateral da boca e administre lentamente, em pequenas porções.

**5. CHECAR**

Observe e confirme que a criança engoliu todo o líquido.

- Se a criança cuspir ou vomitar durante ou logo após a administração, **NÃO repetir a dose.**

**6. IDENTIFICAR E GUARDAR**

Após o uso da 1ª dose, escreva o nome da criança e data de abertura. Mantenha o frasco em local seguro, fresco, seco, longe da luz e umidade.

**7. REALIZAR – 2ª DOSE**

No segundo e último dia, repita a administração conforme a prescrição e passos anteriores.

2ª dose

Realizar em: __/__/__

**8. DESCARTAR**

Após o uso da 2ª dose, entregue o frasco à unidade de saúde ou farmácia mais próxima para o descarte adequado do frasco.

ATENÇÃO

- O frasco é individual: use somente para a criança identificada e não compartilhe com outra criança.
- A solução deve ser administrada **SOMENTE POR BOCA.**